

Ošetření a proplach močového katetru pomocí proplachového sáčku

FOTONÁVOD VI.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP



Materiál byl vydán díky finanční podpoře NF Avast



Pokud má váš blízký zavedený močový katetr, je potřeba se o něj starat. Denně omývejte genitálie v místě zavedení katetru. Postačí vám voda, mýdlo a rukavice.

Sledujte množství moči, které odchází katetrem do sběrného sáčku. Nemusíte jej měřit, pokud vám to lékař nebo sestra nedoporučili. Je však důležité sledovat, že moči ve sběrném sáčku přibývá a že je tudíž katetr průchozí. Pokud je množství moče výrazně menší než přibližný denní příjem tekutin nemocného nebo pokud v moči pozorujete jemnou drť či hlen, je vhodné močový katetr propláchnout.

Připravte si

Jednorázový sáček určený k proplachu močového katetru
Rukavice

Dezinfekci ve spreji
Jednorázovou podložku



1

Umyjte si ruce a nasadte si rukavice. Jednorázovou podložku umístěte pod močový katetr v místě, kde je spojen se sběrným sáčkem. Otevřte sáček určený k proplachu. Odezinfikujte spoj mezi močovým katetrem a sběrným sáčkem.



2

Odstraňte krytku z proplachového sáčku. Odpojte hadičku ze sběrným sáčkem a na konec močového katetru nasadte proplachový sáček. Uvolněte pojistku na proplachovém sáčku.



3

Mírným tlakem vyprazdňujte obsah sáčku. Pokud to jde ztěžka, tlak povolte a opakujte, dokud se katetr neuvolní. Poté aplikujte celý obsah.



4

Zalomte konec katetru, poté proplachový sáček odpojte a nasadte zpět sáček sběrný. Měli byste vidět, jak do sběrného sáčku odchází tekutina.



5

Výborně!